

古代经典名方关键信息表
（“茵陈蒿汤”等 59 首汉族医药方剂）
（征求意见稿）

（一）茵陈蒿汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	茵陈蒿六两，栀子十四枚（擘），大黄二两（去皮）。上三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分三服。	茵陈 （花茵陈）	菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. 或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 的干燥地上部分	生品	82.80g	上三味，以水2400mL，先煮茵陈至1200mL，纳余药，煮取600mL，去药渣，日三服。	【功效】清热，利湿，退黄。 【主治】黄疸湿热证。症见一身面目俱黄，黄色鲜明，发热，无汗或但头汗出，头痛头晕，口渴欲饮，恶心呕吐，腹微满，小便短赤或涩痛不利，大便不爽或秘结，舌红，苔黄腻，脉沉实数或滑数有力。
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	15.96g		
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
备注	据原方中煎煮法“煮取三升”“分温三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：花茵陈 27.60g，栀子 5.32g，大黄 9.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(二) 桂枝甘草汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	桂枝四两（去皮），甘草二两（炙）。上二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	55.20g	上二味，以水600mL，煮取200 mL，去药渣，顿服。	【功效】温补心阳，定惊安悸。 【主治】心悸心阳虚证。症见心悸喜按，按之减轻，胸闷汗出，面色苍白，形寒，舌淡，苔薄，脉虚无力。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取一升”“顿服之”，可知该折算剂量为单次服用剂量，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(三) 麻黄细辛附子汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》（汉·张仲景）	麻黄二两（去节），细辛二两，附子一枚（炮，去皮，破八片）。上三味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	27.60g	上三味，以水2000 mL，先煮麻黄至1600 mL，去沫，纳余药，煮取 600 mL，去药渣，温服200 mL，日三服。	【功效】助阳解表。 【主治】阳虚感寒证。症见发热，恶寒较重，神疲欲寐，舌淡苔白，脉沉微。
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.的子根的加工品	黑顺片	15.00g		
备注	据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：麻黄 9.20g，细辛 9.20g，黑顺片 5.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

（四）梔子柏皮汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 （汉·张仲景）	肥梔子十五个（擘），甘草一两（炙），黄柏二两。 上三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。	梔子	茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	17.10g	上三味，以水 800 mL，煮取 300 mL，去药渣，日二服。	【功效】清热利湿。 【主治】黄疸，热重于湿证。症见身热，发黄，心胸烦闷，口渴，苔黄，脉数。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	13.80g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.的干燥树皮	生品	27.60g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取一升半”“分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：梔子 8.55g，炒甘草 6.90g，黄柏 13.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

（五）黄芩汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《 伤 寒 论》 (汉•张仲景)	黄芩三两，芍药二两，甘草二两(炙)，大枣十二枚(擘)。上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	41.40g	上四味，以水 2000mL，煮取 600 mL，去药渣，温服 200mL，日二服、夜一服。	【功效】清热止利，和中止痛。 【主治】泄泻、痢疾之大肠湿热证。症见腹痛下利，身热，口苦，舌红苔黄，脉数。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：黄芩 13.80g，白芍 9.20g，炒甘草 9.20g，大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

（六）茯苓桂枝甘草大枣汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉•张仲景)	茯苓半斤，桂枝四两（去皮），甘草二两（炙），大枣十五枚（擘）。上四味，以甘烂水一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	110.00g	上四味，以水2000mL，先煮茯苓至1600mL，纳余药，煮取 600 mL，去药渣，温服 200 mL，日三服。	【功效】温通心阳，化气利水。 【主治】心阳不足，水饮欲动证。症见脐下悸，欲作奔豚，小便不利，舌淡苔白，脉细数或脉结代。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	55.20g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	45.00g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：茯苓 36.67g，桂枝 18.40g，炒甘草 9.20g，大枣 15.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(七) 柴胡桂枝汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	桂枝(去皮)、黄芩一两半, 人参一两半, 甘草一两(炙), 半夏二合半(洗), 芍药一两半, 大枣六枚(擘), 生姜一两半(切), 柴胡四两。上九味, 以水七升, 煮取三升, 去滓, 温服一升。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	20.70g	上九味, 以水 1400mL, 煮取 600mL, 去药渣, 温服 200mL。	【功效】和解少阳, 调和营卫。 【主治】少阳兼太阳表证。症见发热, 微恶风寒, 四肢骨节疼痛, 微呕, 胸胁心下微满, 舌苔薄白, 脉浮弦。
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	20.70g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	20.70g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	13.80g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	17.25g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	20.70g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	18.00g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	20.70g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonrifolium</i> Willd.的干燥根	生品	55.20g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”, 可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为: 桂枝 6.90g, 黄芩 6.90g, 人参 6.90g, 炒甘草 4.60g, 清半夏 5.75g, 白芍 6.90g, 大枣 6.00g, 生姜 6.90g, 柴胡 18.40g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1~3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草: 参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法, 建议将甘草原药材除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 趁湿清炒, 炒至微黄, 干燥。						

（八）通脉四逆汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《 伤 寒 论》 （ 汉 • 张 仲 景 ）	甘草二两（炙），附子大者一枚（生用，去皮，破八片），干姜三两。上三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。	甘草	豆 科 植 物 甘 草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g	上三味，以水 600mL，煮 取 240mL，去药渣，日二次，温服。	【功效】回阳通脉。 【主治】少阴病，阴盛格阳证。症见下利清谷，手足厥逆，面赤，脉微欲绝。
		附子	毛 茛 科 植 物 乌 头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品	黑顺片	15.00g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	41.40g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取一升二合”“分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：炒甘草 13.80g，黑顺片 7.50g，干姜 20.70g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

（九）桂枝加厚朴杏子汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤 寒 论》 （汉·张仲景）	桂枝三两（去皮），甘草二两（炙），生姜三两（切），芍药三两，大枣十二枚（擘），厚朴二两（炙，去皮），杏仁五十枚（去皮尖）。上七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。	桂枝	樟 科 植 物 肉 桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g	上七味，以水1400mL，煮取600mL，去药渣，温服200mL。	【功效】解肌发表，降气平喘。 【主治】太阳中风兼喘证。症见恶风发热，汗出头痛，鼻鸣干呕，喘息气逆，舌苔白，脉浮缓或浮弱。
		甘草	豆 科 植 物 甘 草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	41.40g		
		白芍	毛 茛 科 植 物 芍 药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	41.40g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	36.00g		
		厚朴	木 兰 科 植 物 厚 朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	27.60g		
		苦杏仁	薔 薇 科 植 物 杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子	焯苦杏仁	18.50g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：桂枝 13.80g，炒甘草 9.20g，生姜 13.80g，白芍 13.80g，大枣 12.00g，姜厚朴 9.20g，焯苦杏仁 6.17g 。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(十) 桂枝麻黄各半汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	桂枝一两十六铢(去皮), 芍药、生姜(切)、甘草(炙)、麻黄(去节)各一两, 大枣四枚(擘), 杏仁二十四枚(汤浸, 去皮尖及两仁者)。上七味, 以水五升, 先煮麻黄一二沸, 去上沫, 内诸药, 煮取一升八合, 去滓, 温服六合。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	23.00g	上七味, 以水 1000mL, 先煮麻黄, 去沫, 纳余药, 煮取 360mL, 去药渣, 温服 120mL。	【功效】发汗解表, 调和营卫。 【主治】太阳伤寒之表郁轻证。症见发热恶寒, 热多寒少, 面赤, 无汗, 身痒, 脉微缓。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	13.80g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	13.80g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	13.80g		
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	13.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	12.00g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子	焯苦杏仁	8.88g		
备注	1. 据原方中煎煮法“煮取一升八合”“温服六合”, 可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为: 桂枝 7.67g, 白芍 4.60g, 生姜 4.60g, 炒甘草 4.60g, 麻黄 4.60g, 大枣 4.00g, 焯苦杏仁 2.96g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1~3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2. 炒甘草: 参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法, 建议将甘草原药材除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 趁湿清炒, 炒至微黄, 干燥。						

(十一) 小陷胸汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 （汉•张仲景）	黄连一两，半夏半升（洗），瓜蒌实大者一枚。上三味，以水六升，先煮瓜蒌，取三升，去滓，内诸药，煮取二升，去滓，分温三服。	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	13.80g	上三味，以水1200mL，先煮瓜蒌至600mL，去药渣，纳余药，煮取 400mL，去药渣，日三服。	【功效】清热化痰，宽胸散结。 【主治】痰热互结之小结胸证。症见心下痞闷，按之则痛，或胸闷喘满，咳吐黄痰，苔黄腻，脉浮滑。
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		瓜蒌	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.的干燥成熟果实	生品	60.00g		
备注	据原方中煎煮法“煮取二升”“分温三服”，可知本方每服量约为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：黄连 4.60g，清半夏 11.50g，瓜蒌 20.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(十二) 柴胡桂枝干姜汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 （汉•张仲景）	柴胡半斤，桂枝三两（去皮），干姜二两，栝楼根四两，黄芩三两，牡蛎二两（熬），甘草二两（炙）。上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.的干燥根	生品	110.00g	上七味，以水2400mL，煮取1200mL，去药渣，再煎至600mL，温服200mL，日三服。	【功效】和解少阳，温化水饮。 【主治】少阳病兼水饮内结。症见往来寒热，胸胁满闷，心烦口渴，小便不利，头目眩晕，头汗，舌苔薄黄，脉沉弦。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	生品	27.60g		
		天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根	生品	55.20g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	41.40g		
		牡蛎	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg)、大连湾牡蛎 <i>Crassostrea talienwhanensis</i> (Crosse) 或近江牡蛎 <i>Crassostrea ariakensis</i> (Wakiya) 的贝壳	炒牡蛎	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
备注	1.据原方中煎煮法“煎取三升，温服一升”，可知本方每服量约为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：柴胡 36.67g，桂枝 13.80g，干姜 9.20g，天花粉 18.40g，黄芩 13.80g，炒牡蛎 9.20g，炒甘草 9.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。						

	上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒牡蛎：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法。 3.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。
--	---

(十三) 桂枝人参汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 （汉•张仲景）	桂枝四两（别切），甘草四两（炙），白术三两，人参三两，干姜三两。上五味，以水九升，先煮四味，取五升，内桂，更煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。	桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	55.20g	上五味，以水 1800mL，先煮甘草、白术、人参、干姜至 1000mL，加入桂枝，再煮取 600mL，去药渣，温服 200mL，日二服、夜一服。	【功效】温阳健脾，解表散寒。 【主治】脾胃虚寒，复感风寒表证。症见发热恶寒，头身疼痛，心下痞硬，腹痛，下利便溏，舌淡苔白滑，脉浮虚。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	55.20g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	41.40g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 干燥根茎	生品	41.40g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：桂枝 18.40g，炒甘草 18.40g，白术 13.80g，人参 13.80g，干姜 13.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 2~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(十四) 生姜泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉•张仲景)	生姜四两（切），甘草三两（炙），人参三两，干姜一两，黄芩三两，半夏半升（洗），黄连一两，大枣十二枚（擘）。上八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	55.20g	上八味，以水2000mL，煎至1200mL，去药渣，再煮取600mL，温服200mL，日三服。	【功效】和胃降逆，散水消痞。 【主治】水热互结之痞证。症见心下痞硬，干噎食臭，肠鸣下利，舌淡苔白滑，脉沉或弦。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎。	炒甘草	41.40g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	生品	13.80g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	41.40g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	13.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	1.据原方中煎煮法“煎取三升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：生姜 18.40g，炒甘草 13.80g，人参 13.80g，干姜 4.60g，黄芩 13.80g，清半夏 11.50g，黄连 4.60g，大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

（十五）白虎加人参汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 （汉•张仲景）	知母六两，石膏一斤（碎），甘草二两（炙），人参三两，粳米六合。上五味，以水一斗，煮米熟，汤成去滓，温服一升，日三服。	知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎	生品	82.80g	上五味，以水2000mL，米熟汤成，去药渣，温服200mL，日三服。	【功效】清热，益气，生津。 【主治】阳明气分热盛，气津两伤证。症见高热，大汗，口渴欲饮或饮不解渴，口干舌燥，心烦，或背微恶寒，脉洪大。亦治暑热。
		石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 (CaSO ₄ ·2H ₂ O)	生品	220.00g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	27.60g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		粳米	禾本科植物粳稻 <i>Oryza sativa</i> L.subsp. <i>japonica</i> Kato 的干燥成熟种仁	生品	105.60g		
备注	1.据原方中煎煮法“温服一升”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：知母 27.60g，石膏 73.33g，炒甘草 9.20g，人参 13.80g，粳米 35.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(十六) 桔梗汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	桔梗一两，甘草二两。上二味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。	桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.的干燥根	生品	13.80g	上二味，以水 600mL，煮取 200mL，去药渣，日二次，温服。	【功效】清热，宣肺，排脓。 【主治】肺痈或少阴病咽痛。症见咳而胸满，寒战，咽干或咽痛，时出浊唾腥臭，或吐脓如米粥，脉数。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
备注	据原方中煎煮法“煮取一升”“分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：桔梗 6.90g，甘草 13.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(十七) 大黄附子汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	大黄三两，附子三枚（炮），细辛二两。上三味，以水五升，煮取二升，分温三服。	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎	生品	41.40g	上三味，以水1000mL，煮取400mL，日三次，温服。	【功效】温里散寒，通便止痛。 【主治】大肠寒结证。腹痛便秘，胁下偏痛，发热，畏寒肢冷，舌苔白腻，脉弦紧。
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.子根的加工品	黑顺片	45.00g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
备注	据原方中煎煮法“煮取二升，分温三服”，可知本方每服量约为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：大黄 13.80g，黑顺片 15.00g，细辛 9.20g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(十八) 射干麻黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》 (汉·张仲景)	射干十三枚、一云三两，麻黄四两，生姜四两，细辛三两，紫菀三两，款冬花三两，五味子半升，大枣七枚，半夏大者八枚（洗）、一法半升。上九味，以水一斗二升，先煮麻黄两沸，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。	射干	鸢尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.的干燥根茎	生品	41.40g	上九味，以水2400mL，先煮麻黄，去沫，纳余药，煮取600mL，日三次，温服。	【功效】宣肺祛痰，降气止咳。 【主治】咳嗽、哮喘之寒饮停肺证。症见咳嗽喘促，喉中有哮鸣音，胸膈满闷，痰稀薄色白，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	55.20g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	55.20g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		紫菀	菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f.的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		款冬花	菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L.的干燥花蕾	生品	41.40g		
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.的干燥成熟果实	生品	37.00g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	21.00g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	34.50g		

备注	1.据原方中煎煮法“煮取三升”“分温三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：射干 13.80g，麻黄 18.40g，生姜 18.40g，细辛 13.80g，紫菀 13.80g，款冬花 13.80g，五味子 12.33g，大枣 7.00g，清半夏 11.50g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.射干剂量以“三两”折算，半夏剂量以“半升”折算。
----	---

(十九) 厚朴三物汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	厚朴八两，大黄四两，枳实五枚。上三味，以水一斗二升，先煮二味，取五升，内大黄，煮取三升，温服一升。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	110.40g	上三味，以水2400mL，先煮厚朴、枳实至 1000mL，后入大黄，煮取 600mL，温服 200mL。	【功效】行气除满，泻热通便。 【主治】实热内积，气机壅滞证。症见腹部胀满疼痛，大便不通，舌红苔黄，脉数。
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎	生品	55.20g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果	生品	69.00g		
备注	据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：厚朴 36.80g，大黄 18.40g，枳实 23.00g。根据本方及其他根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(二十) 小半夏加茯苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	半夏一升，生姜半斤，茯苓三两、一法四两。上三味，以水七升，煮取一升五合，分温再服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	69.00g	上三味，以水1400mL，煮取300mL，日二次，温服。	【功效】和胃化饮，降逆止呕。 【主治】痰饮内停证。症见呕吐，头目昏眩，心下悸，痞闷不舒，苔白滑，脉滑。
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	110.00g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	41.40g		
备注	1.据原方中煎煮法“煮取一升五合”“分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/2。故本方每次的服药量为：清半夏 34.50g，生姜 55.00g，茯苓 20.70g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。 2.茯苓剂量以“三两”进行折算。						

(二十一) 泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	大黄二两，黄连一两，黄芩一两。上三味，以水三升，煮取一升，顿服之。	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根及根茎	生品	27.60g	上三味，以水 600mL，煮取 200mL，顿服。	【功效】泻火止血。 【主治】邪火内炽证。症见吐血、衄血，心烦口渴，小便黄赤，大便不爽或秘结，舌红苔薄黄，脉数。
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	13.80g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	13.80g		
备注	据原方中煎煮法“煮取一升”“顿服之”，可知该折算剂量为单次服用剂量，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~2 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(二十二) 苓甘五味姜辛汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	茯苓四两，甘草三两，干姜三两，细辛三两，五味半升。 上五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三服。	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	55.20g	上五味，以水1600mL，煮取600mL，去药渣，温服100mL，日三服。	【功效】温肺化饮。 【主治】咳嗽之寒饮停肺证。症见咳嗽痰多，清稀色白，或喜唾涎沫，胸满不舒，舌淡胖，苔白滑，脉弦滑。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	生品	41.40g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.的干燥成熟果实	生品	37.00g		
备注	据原方中煎煮法“煮取三升”“温服半升”，可知本方每服量为煎出总量的 1/6。故本方每次的服药量为：茯苓 9.20g，甘草 6.90g，干姜 6.90g，细辛 6.90g，五味子 6.17g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(二十三) 防己茯苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	防己三两，黄芪三两，桂枝三两，茯苓六两，甘草二两。 上五味，以水六升，煮取二升，分温三服。	防己	防己科植物粉防己 <i>Stephania tetrandra</i> S.Moore 的干燥根	生品	41.40g	上五味，以水1200mL，煮取400mL，日三次，温服。	【功效】益气通阳，利水消肿。 【主治】皮水之脾虚水泛证。症见全身浮肿，四肢肿甚，肢体沉重，肌肤轻微颤动，小便不利，舌淡苔白腻，脉浮或缓。
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membra naceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	41.40g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	82.80g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
备注	据原方中煎煮法“煮取二升”“分温三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：防己 13.80g，黄芪 13.80g，桂枝 13.80g，茯苓 27.60g，甘草 9.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(二十四) 越婢汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	麻黄六两，石膏半斤，生姜三两，大枣十五枚，甘草二两。上五味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。	麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	82.80g	上五味，以水1200mL，先煮麻黄，去沫，纳余药，煮取600mL，日三次，温服。	【功效】发汗利水。 【主治】风水。症见恶风，一身悉肿，自汗，或发热，脉浮。
		石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 (CaSO ₄ •2H ₂ O)	生品	110.00g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	41.40g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	45.00g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
备注	据原方中煎煮法“煮取三升”“分温三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：麻黄 27.60g，石膏 36.67g，生姜 13.80g，大枣 15.00g，甘草 9.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(二十五) 瓜蒌桂枝汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》（汉•张仲景）	瓜蒌根二两，桂枝三两，芍药三两，甘草二两，生姜三两，大枣十二枚。上六味，以水九升，煮取三升，分温三服。	天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根。	生品	27.60g	上六味，以水1800mL，煮取600mL，日三次，温服。	【功效】解肌发表，舒筋缓急。 【主治】柔痉。症见项背强直，肢体拘急，发热，恶风，头痛汗出，苔薄白，脉沉迟。
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	41.40g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	41.40g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	据原方中煎煮法“煮取三升”“分温三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：天花粉 9.20g，桂枝 13.80g，白芍 13.80g，炒甘草 9.20g，生姜 13.80g，大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1~3 次，根据临床实际遵医嘱使用。 上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。						

(二十六) 生姜甘草汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《千金要方》 (唐•孙思邈)	生姜五两，甘草四两，人参三两，大枣十二枚。上四味，㕮咀，以水七升，煮取三升，去滓，分三服。	生姜	姜 科 植 物 姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的 新 鲜 根 茎	生品	69.00g	上四味，粉碎为粗粒，以水1400mL，煮取600mL，去药渣，日三服。	【功效】温肺健脾，益气生津。 【主治】肺痿之虚寒证。症见咳嗽涎沫，量多清稀，短气乏力，咽干而渴，舌淡苔白滑，脉弱。
		甘草	豆 科 植 物 甘 草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	55.20g		
		人参	五加科植物人 参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	1.唐代方药计量传承了汉代的度量衡制度，服法亦参考汉代方剂处理。据原方中煎服法“煮取三升”“分三服”，可知本方每服剂量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：生姜 23.00g，炒甘草 18.40g，人参 13.80g，大枣 12.00g。 2.炒甘草：鉴于《千金要方·卷一·序例》“合和”篇提及诸多药物炮制要求，如“凡用甘草、厚朴、枳实、石南、茵芋、藜芦、皂荚之类皆炙之。”因此建议采用与古代炮制工艺最为接近的炒甘草规格，建议参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法：将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(二十七) 香苏散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《太平惠民和剂局方》 （宋•太平惠民和剂局）	香附子（炒香，去毛）、紫苏叶各四两，甘草一两（炙），陈皮二两（不去白）。上为粗末，每服三钱，水一盏，煎七分，去滓，热服，不拘时候，日三服。若作细末，只服二钱，入盐点服。	香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的干燥根茎	炒香附	165.20g	若为煮散：上药粉碎为粗粒，每服12.39g，以水300mL，煮取210mL，去药渣，日三服。若为散剂：上药粉碎为细末，每服8.26g，入盐点服。	【功效】疏风散寒，理气和中。 【主治】外感风寒，内有气滞证。症见形寒身热，头痛无汗，胸脘痞闷，不思饮食，舌苔薄白，脉浮。
		紫苏叶	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.的干燥叶	生品	165.20g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	41.30g		
		陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	82.60g		
备注	1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，据原方中“日三服”计算，则本方煮散剂的日服总量约为 37.17g，各药的日服量折算如下：炒香附 13.52g，紫苏叶 13.52g，炒甘草 3.38g，陈皮 6.76g；散剂的日服总量约为 24.78g，各药的日服量折算如下：炒香附 9.01g，紫苏叶 9.01g，炒甘草 2.25g，陈皮 4.51g。 2.炒香附：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法。 3.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(二十八) 升麻葛根汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《太平惠民和剂局方》(宋•太平惠民和剂局)	升麻、白芍药、甘草(炙)各十两，葛根十五两。上为粗末，每服三钱，用水一盏半，煎取一钟盏，去滓，稍热服，不计时候，日二、三服，以病气去，身清凉为度。小儿量力服之。	升麻	毛茛科升麻属植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim. 或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.的干燥根茎	生品	413.00g	上药粉碎为粗粒，每服 12.39g，以水 450mL，煮取 300mL，去药渣，温服。小儿酌减。	【功效】辛凉解肌，透邪解毒。 【主治】外感伤寒或瘟疫之斑疹。症见疮疹已发或未发，身热头痛，肢体烦痛，目赤流泪，口渴，舌红，脉数。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	413.00g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	413.00g		
		葛根或粉葛	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.的干燥根	生品	619.50g		
备注	1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 37.17g，各药的日服量折算如下：升麻 8.26g，白芍 8.26g，炒甘草 8.26g，葛根或粉葛 12.39g。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。 3.鉴于古代长期推崇四川等地所产升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.，建议人工栽培优先选择该基原。						

(二十九) 平胃散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《太平惠民和剂局方》（宋•太平惠民和剂局）	苍术五斤（去粗皮，米泔浸二日），厚朴（去粗皮，姜汁制，炒香）、陈皮（去白）各二斤二两，甘草三十两（炒）。上为细末，每服二钱，以水一盏，入生姜二片，干枣两枚，同煎至七分，去姜、枣，带热服，空心、食前。入盐一捻，沸汤点服亦得。	苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz.的干燥根茎	米泔水制苍术	3304.00g	上药粉碎为细末，每服8.26g，以水300mL，入生姜2.00g，大枣6.00g，煮取210mL，去药渣，饭前温服。	【功效】燥湿运脾，行气和胃。 【主治】湿困脾胃证。症见脘腹胀满，不思饮食，口淡无味，恶心呕吐，暖气吞酸，肢体沉重，怠惰嗜卧，常多自利，舌苔白腻而厚，脉缓。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	1404.20g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	1404.20g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	清炒甘草	1239.00g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	——		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	——		
		备注	1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为24.78g，各药的日服量折算如下：米泔水制苍术11.14g，姜厚朴4.73g，橘红4.73g，清炒甘草4.18g，另加生姜6.00g，大枣18.00g。 2.米泔水制苍术：参考2020年版《吉林省中药饮片炮制规范》中“米泔水制苍术”炮制方法进行炮制，以大米作为米泔水制作的原料。 3.清炒甘草：参考2025年版《中华人民共和国药典》中清炒法，取净甘草片，炒至颜色加深，微具焦斑，筛去灰屑，取出，放凉。				

(三十) 六和汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《太平惠民和剂局方》 (宋·太平惠民和剂局)	缩砂仁、半夏(汤洗七次)、杏仁(去皮尖)、人参、甘草(炙)各一两,赤茯苓(去皮)、藿香叶(拂去尘)、白扁豆(姜汁略炒)、木瓜各二两,香薷、厚朴(姜汁制)各四两。上剉,每服四钱,水一盏半,生姜三片,枣子一枚,煎至八分,去滓,不拘时候服。	砂仁	姜科植物阳春砂 <i>Amomum villosum</i> Lour.的干燥成熟果实	生品	41.30g	上药粉碎成粗粒,每服16.52g,以水450mL,加生姜3.00g、大枣3.00g,煮取240mL,去药渣。	【功效】健脾和胃,祛暑化湿。 【主治】暑湿困脾证。症见霍乱吐泻,寒热交作,痰喘咳嗽,胸膈痞满,头目昏痛,肢体浮肿,嗜卧倦怠,小便赤涩,冒暑烦闷,或见痢疾,舌苔白滑,脉濡。
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	41.30g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子	焯苦杏仁	41.30g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	41.30g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	41.30g		
		赤茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 淡棕色、淡红色的干燥菌核	生品	82.60g		
		广藿香叶	唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的干燥叶片	生品	82.60g		
		白扁豆	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L.的干燥成熟种子	姜白扁豆	82.60g		
		木瓜	蔷薇科植物贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 的干燥近成熟果实	生品	82.60g		
		香薷	唇形科植物石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim.或江香薷 <i>Mosla chinensis</i> 'Jiangxiangru'的干燥地	生品	165.20g		

			上部分				
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	165.20g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	——		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	——		
备注	1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 49.56g，各药的日服量折算如下：砂仁 2.36g，清半夏 2.36g，煨苦杏仁 2.36g，人参 2.36g，甘草 2.36g，赤茯苓 4.72g，广藿香叶 4.72g，姜白扁豆 4.72g，木瓜 4.72g，香薷 9.44g，姜厚朴 9.44g，另加生姜 9.00g、大枣 9.00g。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。 3.姜白扁豆：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中姜汁炙法。						

(三十一) 导痰汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《传信适用方》(宋•吴彦夔)	半夏四两（汤洗七次），天南星一两（细切，姜汁浸），枳实一两（去瓢），橘红一两，赤茯苓一两。上为粗末，每服三大钱，水两盏，姜十片，煎至一盏，去滓，温服，食后。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.)Breit. 的干燥块茎	清半夏	165.20g	上药粉碎为粗粒，每服12.39g，以水600mL，加生姜10.00g，煮取300mL，去药渣，饭后温服。	【功效】燥湿豁痰，行气开郁。 【主治】痰厥证。症见头目眩晕，头痛呕逆，或胸膈痞塞，胁肋胀满，喘急痰嗽，涕唾稠粘，舌苔厚腻，脉滑。
		天南星	天南星科植物天南星 <i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott 或异叶天南星 <i>Arisaema heterophyllum</i> Bl.的干燥块茎	制天南星	41.30g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果	生品	41.30g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	41.30g		
		赤茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.)Wolf 淡棕色、淡红色的干燥菌核	生品	41.30g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	——		
		备注	本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为37.17g，各药的日服量折算如下：清半夏18.59g，制天南星4.65g，枳实4.65g，橘红4.65g，赤茯苓4.65g，另加生姜30.00g。				

(三十二) 小蓟饮子

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《济生方》 (宋·严用和)	生地黄四两(洗), 小蓟根、滑石、通草、蒲黄(炒)、淡竹叶、藕节、当归(去芦, 酒浸)、山栀子仁、甘草(炙)各半两。上咬咀, 每服四钱, 水一盏半, 煎至八分, 去滓, 温服, 空心食前。	地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根	生品	165.20g	上药粉碎成粗粒, 每服16.52g, 以水450mL, 煮取240mL, 去药渣, 饭前温服。	【功效】凉血止血, 利水通淋。 【主治】血淋、尿血之热结下焦证。症见尿中带血, 小便频数, 赤涩热痛, 舌红, 脉数。
		小蓟根	菊科植物刺儿菜 <i>Cirsium setosum</i> (Willd.)MB. 的干燥根	生品	20.65g		
		滑石	硅酸盐类矿物滑石族滑石, 主含含水硅酸镁 $[\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2]$	生品	20.65g		
		木通	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. 的干燥藤茎	生品	20.65g		
		蒲黄	香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉	炒蒲黄	20.65g		
		竹叶	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle. 的干燥叶	生品	20.65g		
		藕节	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥根茎节部	生品	20.65g		

		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	20.65g		
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	20.65g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	20.65g		
备注	1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 49.56g，各药的日服量折算如下：地黄 23.32g，小蓟根 2.92g，滑石 2.92g，木通 2.92g，炒蒲黄 2.92g，竹叶 2.92g，藕节 2.92g，酒当归 2.92g，栀子 2.92g，炒甘草 2.92g。 2.宋代通草为今木通，且历代为多基原，优先推荐历代主流基原木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.。 3.炒蒲黄：参考 2018 年版《湖北省中药饮片炮制规范》。 4.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(三十三) 芍药汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《素问病机气宜保命集》（金•刘完素）	芍药一两，当归、黄连各半两，槟榔二钱，木香二钱，甘草二钱（炙），大黄三钱，黄芩半两，官桂一钱半。上咬咀，每服半两，水二盏，煎至一盏，食后温清服。	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	41.30g	上药粉碎成粗粒，每服20.65g，以水600mL，煮取300mL，饭后温服。	【功效】清热燥湿，调气和血。 【主治】湿热痢疾。症见腹痛，便脓血，赤白相兼，里急后重，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉弦数。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	20.65g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	20.65g		
		槟榔	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L.的干燥成熟种子	生品	8.26g		
		木香	菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne.的干燥根	生品	8.26g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	8.26g		
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎	生品	12.39g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	20.65g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	6.20g		

备注	1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 61.95g，各药的日服量折算如下：白芍 17.45g，当归 8.73g，黄连 8.73g，槟榔 3.49g，木香 3.49g，炒甘草 3.49g，大黄 5.24g，黄芩 8.73g，肉桂 2.62g。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。
----	---

(三十四) 门冬清肺饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《内 外 伤 辨 惑 论》（金•李杲）	紫菀茸一钱五分，黄芪、白芍药、甘草已上各一钱，人参（去芦）、麦门冬已上各五分，当归身三分，五味子三个。上咬咀，分作二服，每服水二盏，煎至一盏，去粗，温服，食后。	紫菀	菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f. 的干燥根	生品	6.20g	上药粉碎成粗粒，每服12.20g，以水600mL，煮取300mL，去药渣，饭后温服。日二服。	【功效】补脾益肺，养阴生津。 【主治】肺脾气虚证。症见气促，气短，精神萎靡，困倦乏力，食欲不振，或见喘嗽，或见衄血吐血，舌淡少苔，脉细弱。
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.的干燥根	生品	4.13g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	4.13g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	4.13g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	2.07g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品	2.07g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	1.24g		
		五味子	木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.的干燥成熟果实	生品	0.42g		
备注							

(三十五) 普济消毒饮子

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《东垣试效方》(金•李杲)	黄芩、黄连各半两，人参三钱，橘红（去白）、玄参、生甘草各二钱，连翘、黍粘子、板蓝根、马勃各一钱，白僵蚕七分（炒），升麻七分，柴胡二钱，桔梗二钱。上件为细末……咬咀，如麻豆大，每服秤五钱，水二盏，煎至一盏，去滓，稍热，时时服之。	黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	20.65g	上药粉碎成粗粒，每服20.65g，以水600mL，煮取300mL，去药渣，温服。	【功效】疏风散邪，清热解毒。 【主治】大头瘟。症见恶寒发热，头面红肿焮痛，目不能开，咽喉不利，舌燥口渴，舌红苔黄，脉浮数有力。
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	20.65g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	12.39g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	8.26g		
		玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根	生品	8.26g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	8.26g		
		连翘	木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实	生品	4.13g		
		牛蒡子	菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L.的干燥成熟果实	生品	4.13g		
		南板蓝根	爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees)Bremek. 的干燥根茎和根	生品	4.13g		
		马勃	灰包科真菌脱皮马勃 <i>Lasiosphaera fenzlii</i> Reich.、大马勃 <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch ex Pers.) Lloyd 或	生品	4.13g		

			紫色马勃 <i>Calvatia lilacina</i> (Mont. et Berk.) Lloyd 的干燥子实体				
		僵蚕	蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 4~5 龄的幼虫感染(或人工接种)白僵菌 <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuillant 而致死的干燥体	炒僵蚕	2.89g		
		升麻	毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.)Maxim. 或毛茛科植物升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 的干燥根茎	生品	2.89g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.的干燥根	生品	8.26g		
		桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.的干燥根	生品	8.26g		
备注	1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 61.95g，各药的日服量折算如下：黄芩 10.91g，黄连 10.91g，人参 6.54g，橘红 4.36g，玄参 4.36g，甘草 4.36g，连翘 2.18g，牛蒡子 2.18g，南板蓝根 2.18g，马勃 2.18g，炒僵蚕 1.53g，升麻 1.53g，柴胡 4.36g，桔梗 4.36g。 2.鉴于古代长期推崇四川等地所产升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.，建议人工栽培优先选择该基原。						

（三十六）羌活胜风汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《原机启微》（元•倪维德）	白术五分，枳壳、羌活、川芎、白芷、独活、防风、前胡、桔梗、薄荷各四分，荆芥、甘草各三分，柴胡七分，黄芩五分。 作一服，水二盏，煎至一盏，去滓，热服。	白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	2.07g	上药以水600mL，煮取300mL，去药渣，温热服。	【功能】疏风散翳。 【主治】风热犯目证。症见眼眵多，目干涩，视物不清，畏光，目赤肿痛，赤脉贯睛，头痛鼻塞，头沉，眉骨酸疼，目生外翳，舌边尖红，苔薄黄，脉浮数。
		枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实	生品	1.65g		
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	1.65g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	1.65g		
		白芷	伞形科植物杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根	生品	1.65g		
		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim.f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	1.65g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	1.65g		

		前胡	伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn 的干燥根	生品	1.65g		
		桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根	生品	1.65g		
		薄荷	唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq. 的干燥地上部分	生品	1.65g		
		荆芥	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq. 的干燥地上部分。	生品	1.24g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.24g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd. 的干燥根	生品	2.89g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	2.07g		
备注	本方直接折算剂量为每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量为 73.08g，各药剂量如下：白术 6.21g，枳壳 4.95g，羌活 4.95g，川芎 4.95g，白芷 4.95g，独活 4.95g，防风 4.95g，前胡 4.95g，桔梗 4.95g，薄荷 4.95g，荆芥 3.72g，甘草 3.72g，柴胡 8.67g，黄芩 6.21g。						

(三十七) 牛蒡甘桔汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《外科正宗》（明•陈实功）	牛蒡子、桔梗、陈皮、天花粉、黄连、川芎、赤芍、甘草、苏木各一钱。水二钟，煎八分，食后服。	牛蒡子	菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L.的成熟果实	生品	3.73 g	以水 400 mL，煮取 160mL，饭后服。	【功效】清热解毒，散结消肿。 【主治】发颐，症见耳项结块，微热，疼痛，张口不利，舌红苔白，脉数。
		桔梗	桔 梗 科 植 物 桔 梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.的干燥根	生品	3.73 g		
		陈皮	芸 香 科 植 物 橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	3.73 g		
		天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或 双 边 栝 楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根	生品	3.73 g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	生品	3.73 g		
		川芎	伞 形 科 植 物 川 芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	3.73 g		
		赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	3.73 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.干燥根和根茎	生品	3.73 g		
		苏木	豆科植物苏木 <i>Caesalpinia sappan</i> L.的干燥心材	生品	3.73 g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。						

（三十八）大补元煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》（明•张介宾）	人參少则用一、二钱，多则用一、二两，山药二钱（炒），熟地少则用二、三钱，多则用二、三两，杜仲二钱，当归二、三钱，山茱萸一钱，枸杞二、三钱，炙甘草一、二钱。水二钟，煎七分，食远温服。	人參	五加科植物人參 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	5.60 g	以水 400 mL，煎至 140 mL，食远温服。	【功效】固本培元，补益气血。 【主治】肾元亏虚，气血不足证。症见精神萎顿，腰酸耳鸣，汗出肢冷，心悸气短，脉微细。
		山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb.的干燥根茎	清炒山药	7.46 g		
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	9.33 g		
		杜仲	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.的干燥树皮	生品	7.46 g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels.的干燥根。	生品	9.33 g		
		山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果肉	生品	3.73 g		
		枸杞子	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L.的干燥成熟果实	生品	9.33 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	5.60 g		
备注	1. 根据临床实际和各药用量比例，人參、熟地取小剂量中值，即人參一钱半，熟地二钱半；当归、枸杞、甘草取范围中值，即当归二钱半，枸杞子二钱半，甘草一钱半。 2. 本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。 3. 炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。 4. 清炒山药：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法。						

（三十九）左归饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》（明•张介宾）	熟地二、三钱，或加至一、二两，山药二钱，枸杞二钱，炙甘草一钱，茯苓一钱半，山茱萸一、二钱。水二盅，煎七分，食远服。	熟地黄	玄参科植物地 黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	9.33 g	以水 400 mL，煮取 140 mL，食远服。	【功效】补益肾阴。 【主治】肾阴不足证。症见腰酸遗泄，盗汗，口燥咽干，口渴欲饮，舌红少苔，脉细数。
		山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb.的干燥根茎	生品	7.46 g		
		枸杞子	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L.的干燥成熟果实	生品	7.46 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	3.73 g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> （Schw.）Wolf 的干燥菌核	生品	5.60 g		
		山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb.et Zucc.的干燥成熟果肉	生品	5.60 g		
备注	1. 根据临床实际和各药用量比例，熟地取小剂量中值，即熟地二钱半；山茱萸取范围中值，即山茱萸一钱半。 2. 本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。 3. 炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

（四十）茜根散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》 （明•张介宾）	茜根、黄芩、阿胶（炒珠）、侧柏叶、生地黄各二钱，甘草一钱（炙）。水一盏半，姜三片，煎七分，食远服。	茜草	茜草科植物茜草 <i>Rubia cordifolia</i> L.的干燥根和根茎	生品	7.46 g	以水 300 mL，加生姜 3.00g，煮取 140 mL，食远服。	【功效】 清热养阴，凉血止血。 【主治】 阴虚火旺之血证。症见咯血、嗽血、鼻衄，痰中带血，血色鲜红，舌红，苔黄，脉数。
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	7.46 g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> Linnaeus 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	阿胶珠	7.46 g		
		侧柏叶	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥枝梢和叶	生品	7.46 g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	7.46 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	3.73g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	3.00 g		
备注	1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

（四十一）清胃汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《审视瑶函》（明·傅仁宇）	山梔仁（炒黑）、枳壳、苏子各六分，石膏（煨）、川黄连（炒）、陈皮、连翘、归尾、荆芥穗、黄芩、防风各八分，甘草三分（生）。上剉剂，白水二钟，煎至一钟，去滓，热服。	梔子	茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实的炮制加工品	焦梔子	2.24 g	上药粉碎为粗粒，以水 400 mL，煮取 200 mL，去药渣，温热服。	【功效】清胃泻火，疏风散邪。 【主治】阳明积热之眼疾。症见胞睑红、肿、热、痛而痒，舌红，苔黄，脉数。
		枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实	生品	2.24 g		
		紫苏子	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥成熟果实	生品	2.24 g		
		石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙（ $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ）	煨石膏	2.98 g		
		黄连（川黄连）	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 的干燥根茎	炒黄连	2.98 g		
		陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	2.98 g		
		连翘	木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实	生品	2.98 g		
		当归尾	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥支根	生品	2.98 g		

		荆芥穗	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq.的干燥花穗	生品	2.98 g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi.的干燥根	生品	2.98 g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	生品	2.98 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	1.12 g		
备注	1. 本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。 2. 炒黄连：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法。						

(四十二) 固本止崩汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》 (清•傅山)	大熟地一两（九蒸），白术一两（土炒焦），黄芪三钱（生用），当归五钱（酒洗），黑姜二钱，人参三钱。水煎服。	熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	37.30 g	水煎服。	【功效】补气摄血，固冲止崩。 【主治】脾肾两虚、气不摄血之崩漏。症见妇人血崩，淋漓不止，血色淡而质稀，面色苍白，神疲，气短乏力，动则汗出，舌淡苔薄白，脉细弱。
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎	土炒白术	37.30 g		
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或 膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.的干燥根	生品	11.19 g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	18.65 g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	姜炭	7.46 g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	11.19 g		
备注	土炒白术：参考 1988 年版《全国中药饮片炮制规范》。						

(四十三) 养精种玉汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》 (清•傅山)	大熟地一两（九蒸），当归五钱（酒洗），白芍五钱（酒炒），山萸肉五钱（蒸熟）。水煎服。	熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	37.30 g	水煎服。	【功效】滋补肝肾，填精益血。 【主治】不孕之肾亏血虚证。症见形体消瘦，久不受孕，体倦乏力，月经量少色淡，舌质淡红，少苔或苔薄，脉虚细或细数。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	18.65 g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	酒白芍	18.65 g		
		山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb.et Zucc.的干燥成熟果肉	蒸山萸肉	18.65 g		
备注	蒸山萸肉：参考 2012 年版《山东省中药饮片炮制规范》。						

（四十四）定经汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》 （清•傅山）	菟丝子一两（酒炒），白芍一两（酒炒），当归一两（酒洗），大熟地五钱（九蒸），山药五钱（炒），白茯苓三钱，芥穗二钱（炒黑），柴胡五分。水煎服。	菟丝子	旋花科植物菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.的干燥成熟种子	酒菟丝子	37.30 g	水煎服。	【功效】 补肾养血，疏肝调经。 【主治】 月经先后不定期之肾虚肝郁证。症见月经或前或后，经行不畅，或时断时续，夹有血块，少腹或乳房胀痛，痛及两胁，舌淡苔白，脉弦细。
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	酒白芍	37.30 g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	37.30 g		
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	18.65 g		
		山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb.的干燥根茎	清炒山药	18.65 g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.)Wolf 的白色干燥菌核	生品	11.19 g		
		荆芥穗	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq.的干燥花穗	荆芥炭	7.46 g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或 狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.的干燥根	生品	1.87 g		
备注	1.酒菟丝子：参考 2012 年版《黑龙江中药饮片炮制规范及标准》。 2.清炒山药：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法。						

(四十五) 调肝汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》 （清•傅山）	山药五钱（炒）， 阿胶三钱（白面炒）， 当归三钱（酒洗）， 白芍三钱（酒炒）， 山萸肉三钱（蒸熟）， 巴戟一钱（盐水浸）， 甘草一钱。 水煎服。	山药	薯 蓣 科 植 物 薯 蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. 的干燥根茎	清炒山药	18.65 g	水煎服。	【功效】补益肝肾，调肝止痛。 【主治】痛经之肾虚肝亢证。症见行经后小腹绵绵作痛，腰部酸胀，经色黯淡、量少，质稀薄，或有潮热，耳鸣、头晕，面色无华，舌淡苔薄，脉沉细。
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	白面炒阿胶	11.19 g		
		当归	伞 形 科 植 物 当 归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels.的干燥根	酒当归	11.19 g		
		白芍	毛 茛 科 植 物 芍 药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	酒白芍	11.19 g		
		山茱萸	山 茱 萸 科 植 物 山 茱 萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb.et Zucc.的干燥成熟果肉	蒸山萸肉	11.19 g		
		巴戟天	茜草科巴戟天属巴戟 <i>Morinda officinalis</i> How 的干燥根	盐巴戟天	3.73 g		
		甘草	豆 科 植 物 甘 草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	3.73 g		
备注	1. 清炒山药：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法。 2. 白面炒阿胶：建议参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中炒法，以白面粉为辅料进行炮制。 3. 蒸山萸肉：参考 2012 年版《山东省中药饮片炮制规范》。						

(四十六) 柴葛解肌汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医学心悟》（清•程国彭）	柴胡一钱二分，葛根一钱五分，赤芍一钱，甘草五分，黄芩一钱五分，知母一钱，贝母一钱，生地二钱，丹皮一钱五分。水煎服。	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.的干燥根	生品	4.48 g	水煎服。	【功效】清热解肌。 【主治】外感风热，里热内盛证。症见发热，头痛，口渴，舌苔黄，脉浮数。
		葛根或粉葛	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.的干燥根	生品	5.60 g		
		赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	3.73 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	1.87 g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi.的干燥根	生品	5.60 g		
		知母	百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.的干燥根茎	生品	3.73 g		
		浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.的干燥鳞茎	生品	3.73 g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	7.46 g		
		牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥根皮	生品	5.60 g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。						

(四十七) 茵陈术附汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医学心悟》 (清•程国彭)	茵陈一钱，白术二钱，附子五分，干姜五分，甘草一钱（炙），肉桂三分（去皮）。水煎服。	茵陈	菊 科 植 物 滨 蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 的干燥地上部分	生品	3.73 g	水煎服。	【功效】温里助阳，利湿退黄。 【主治】黄疸之阴黄。症见身目俱黄，黄色晦暗，身冷肢厥，身体沉重，脘腹痞胀，神倦食少大便稀溏，舌淡苔白或腻，脉濡缓或沉迟。
		白术	菊 科 植 物 白 术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎	生品	7.46 g		
		附子	毛 茛 科 植 物 乌 头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.子根的加工品	黑顺片	1.87 g		
		干姜	姜 科 多 年 生 草 本 植 物 姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎	生品	1.87 g		
		甘草	豆 科 植 物 甘 草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	3.73 g		
		肉桂	樟 科 植 物 肉 桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	1.12 g		
备注	1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。 2.炒甘草：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(四十八) 消癭丸

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医学心悟》(清·程国彭)	元参(蒸)、牡蛎(煅,醋研)、贝母(去心,蒸)各四两。共为末,炼蜜为丸。每服三钱,开水下,日二服。	玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根	蒸玄参	149.20g	上三味,粉碎为细末,制成蜜丸。每服11.19g,温水送服,日二服。	【功效】清热化痰,软坚散结。 【主治】瘰癧、痰核、癭瘤初起。症见颈项结块,或如串珠,或色红高凸,咽干,舌红,脉弦滑略数。
		牡蛎	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg)、大连湾牡蛎 <i>Crassostrea talienwhanensis</i> (Crosse)或近江牡蛎 <i>Crassostrea ariakensis</i> (Wakiya)的贝壳	煅醋淬牡蛎(研)	149.20g		
		浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.的干燥鳞茎	蒸浙贝母	149.20g		
		蜂蜜	蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 <i>Apis cerana</i> Fabricius 所酿的蜜	——	——		
备注	1. 本方直接折算剂量并非每日服量,结合方剂组成及每服量,按日服二次计算,则本方的日服总量约为22.38g,各药的日服量折算如下:蒸玄参7.46g,煅醋淬牡蛎7.46g,蒸浙贝母7.46g。 2. 蒸玄参:参考2025年版《中华人民共和国药典》中蒸法。 3. 煅醋淬牡蛎:参考2025年版《中华人民共和国药典》中煅淬法。 4. 蒸浙贝母:参考2025年版《中华人民共和国药典》中蒸法。						

（四十九）阳和汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《外科证治全生集》 （清•王维德）	熟地黄一两，麻黄五分，鹿角胶三钱，白芥子二钱（炒，研），肉桂一钱，生甘草一钱，炮姜炭五分。水煎服。	熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	37.30 g	水煎服。	【功效】温阳补血，散寒通滞。 【主治】阴疽之阳虚寒凝证。症见患处漫肿无头，皮色不变，酸痛无热，口中不渴，舌淡苔白，脉沉细或迟细。亦治脱疽、流注、痰核、鹤膝风等。
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	1.87 g		
		鹿角胶	鹿科动物马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 或梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 已骨化的角或锯茸后翌年春季脱落的角基经水煎煮、浓缩制成的固体胶	生品	11.19 g		
		白芥子	十字花科白芥属白芥 <i>Sinapis alba</i> L.的干燥成熟种子	炒芥子	7.46 g		
		肉桂	樟科樟属植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	3.73 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	3.73 g		
		干姜	姜科多年生草本植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	姜炭	1.87 g		
备注							

（五十）柴胡清肝汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医宗金鉴》 （清·吴谦）	柴胡、生地各一钱五分，当归二钱，赤芍一钱五分，川芎一钱，连翘二钱（去心），牛蒡子一钱五分（炒，研），黄芩一钱，生栀子（研）、天花粉、甘草节、防风各一钱。水二钟，煎八分，食远服。	柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.的干燥根	生品	5.60 g	以水 400 mL，煮取 160mL，食远服。	【功效】疏肝清热，解毒消痈。 【主治】痈疽初起之肝郁火旺证。症见痈疽焮红热痛，易怒，口苦口干，舌红苔黄，脉弦数。
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	5.60 g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	7.46 g		
		赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	5.60 g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	3.73 g		
		连翘	木犀科连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实	生品（去心）	7.46 g		
		牛蒡子	菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L.的干燥成熟果实	炒牛蒡子	5.60 g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi.的干燥根	生品	3.73 g		
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	3.73 g		
		天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根的干燥根	生品	3.73 g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根或根茎	生品	3.73 g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	生品	3.73 g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。						

（五十一）四物消风饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医宗金鉴》 （清·吴谦）	生地三钱，当归二钱，荆芥、防风各一钱五分，赤芍、川芎、白鲜皮、蝉蜕、薄荷各一钱，独活、柴胡各七分。红枣肉二枚，水二钟，煎八分，去渣服。	地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	11.19g	以水400mL，煮取160mL，去药渣服用。	【功效】养血祛风，润燥止痒。 【主治】瘾疹、白疔、湿疹之血虚风燥证。症见皮肤瘙痒，抓痕，或见血痂、落屑，皮肤粗糙、干燥、皲裂，舌红少津，脉细数。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	7.46g		
		荆芥	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuifolia</i> Briq.的干燥地上部分	生品	5.60g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	生品	5.60g		
		赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	3.73g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	3.73g		
		白鲜皮	芸香科植物白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz.的干燥根皮	生品	3.73g		
		蝉蜕	蝉科昆虫黑蚱蝉 <i>Cryptotympana atrata</i> (Fabricius)的若虫羽化时脱落的皮壳	生品	3.73g		
		薄荷	唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq.的干燥地上部分	生品	3.73g		

		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥 根	生品	2.61g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum</i> <i>chinense</i> DC.或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.的干燥根	生品	2.61g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	6.00g		
备注							

(五十二) 滋水清肝饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《寿世新编》 (清·万潜斋)	熟地四五钱，或七八钱或两余，当归、白芍各一二钱，枣仁三钱，山萸肉一钱五分或二钱，云苓三五钱，山药四五钱，柴胡数分或一钱余，山梔一二钱，丹皮一钱或二钱，泽泻二钱。水煎服。	熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄 (蒸法)	27.98g	水煎服。	【功效】 滋阴养血，疏肝清热。 【主治】 阴虚肝郁证。症见胸胁胃脘胀痛，耳聋耳鸣，气逆，呕吐吞酸，或见腰膝酸软、头目眩晕、咽干口燥、小便赤热等，舌红苔少，脉弦细。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	5.60g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	5.60g		
		酸枣仁	鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>Spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子	生品	11.19g		
		山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.的干燥成熟果肉	生品	6.53g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	14.92g		
		山药	薯蓣科植物薯蓣 <i>Dioscorea opposita</i> Thunb. 的干燥根茎	生品	16.79g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC. 或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.的	生品	2.80g		

			干燥根				
		栀子	茜草科栀子属植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	5.60g		
		牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥 根皮	生品	5.60g		
		泽泻	泽泻科植物泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn.的 干燥块茎	生品	7.46g		
备注	根据临床实际和各药用量比例，熟地黄取中间剂量的范围中值，即七钱半；余药均取范围中值，当归、白芍、栀子、牡丹皮取一钱半；山茱萸取一钱七分五厘；茯苓取四钱；山药取四钱半；柴胡取五分和一钱之间的中间值，即七分五厘。						

(五十三) 增液承气汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《温病条辨》（清·吴瑭）	元参一两，麦冬八钱（连心），细生地八钱，大黄三钱，芒硝一钱五分。水八杯，煮取三杯，先服一杯，不知再服。	玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根	生品	37.30g	以水1600mL，煮取600mL，每服200mL。	【功效】滋阴增液，泻热通便。 【主治】便秘之津亏热结证。症见大便秘结，脘腹胀满，口干唇燥，舌苔黄，脉细数。
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> （L.f.）Ker-Gawl.的干燥块根	生品	29.84g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	29.84g		
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根和根茎	生品	11.19g		
		芒硝	硫酸盐类矿物芒硝，主含含水硫酸钠(Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O)	生品	5.60g		
备注	1.本方未明确日服次数，建议结合临床实际，日 1~3 次遵医嘱使用。 2.鉴于原文用细生地入药，建议地黄用药部位选用干燥细小块根。						

(五十四) 膈下逐瘀汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医林改错》 (清•王清任)	灵脂二钱(炒), 当归三钱, 川芎二钱, 桃仁三钱(研泥), 丹皮二钱, 赤芍二钱, 乌药二钱, 元胡一钱, 甘草三钱, 香附钱半, 红花三钱, 枳壳钱半。水煎煮。	五灵脂	鼯鼠科动物复齿鼯鼠 <i>Trogopterus xanthipes</i> Milne-Edwards 的干燥粪便	醋五灵脂	7.46g	水煎服。	【功效】活血祛瘀, 行气止痛。 【主治】膈下瘀血证。症见胁下腹中有积块, 或小儿痞块, 或肚腹疼痛, 痛处不移, 或卧则腹坠, 舌质暗, 或有瘀点、瘀斑, 脉涩。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	11.19g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	7.46g		
		桃仁	蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch 或山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch.的干燥成熟种子	生品 (研泥)	11.19g		
		牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥根皮	生品	7.46g		
		赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia Lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	7.46g		
		乌药	樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.的干燥块根	生品	7.46g		
		延胡索	罂粟科植物延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W. T. Wang 的干燥块茎	生品	3.73g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	11.19g		
		香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的干燥根茎	生品	5.60g		
		红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L.的干燥花	生品	11.19g		
枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实	生品	5.60g				
备注							

(五十五) 会厌逐瘀汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医林改错》 (清•王清任)	桃仁五钱（砂），红花五钱，甘草三钱，桔梗三钱，生地四钱，当归二钱，玄参一钱，柴胡一钱，枳壳二钱，赤芍二钱。水煎服。	桃仁	蔷薇科植物山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch.的干燥成熟种子	炒桃仁	18.65g	水煎服。	【功效】活血化瘀，散结利咽。 【主治】喉痹之气滞血瘀证。症见咽喉不利或肿痛，声音嘶哑，咳嗽，或饮水即呛，舌质暗或有瘀斑，脉弦或涩。
		红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L.的干燥花	生品	18.65g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	11.19g		
		桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC.的干燥根	生品	11.19g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	14.92g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	7.46g		
		玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根	生品	3.73g		
		柴胡	伞形科植物柴胡 <i>Bupleurum chinense</i> DC.或狭叶柴胡 <i>Bupleurum scorzonnerifolium</i> Willd.的干燥根	生品	3.73g		
		枳壳	芸香科柑橘属植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥未成熟果实	生品	7.46g		
		赤芍	毛茛科芍药属植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	7.46g		
备注							

（五十六）连朴饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《霍乱论》（清·王士雄）	制厚朴二钱，川连（姜汁炒）、石菖蒲、制半夏各一钱，香豉（炒）、焦栀各三钱，芦根二两。水煎温服。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	7.46g	水煎温服。	【功效】清热化湿，理气和中。 【主治】湿热霍乱。症见上吐下泻，胸脘痞闷，心烦躁乱，小便短赤，舌红苔黄腻，脉滑数。
		黄连（川黄连）	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao 的干燥根茎	姜黄连	3.73g		
		石菖蒲	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎	生品	3.73g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	姜半夏	3.73g		
		淡豆豉	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr.的成熟种子的发酵加工品	炒淡豆豉	11.19g		
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 干燥成熟果实的炮制加工品	焦栀子	11.19g		
		芦根	禾本科植物芦苇 <i>Phragmites communis</i> Trin.的干燥根茎	生品	74.60g		
备注	1.姜黄连：参考 2008 年版《北京市中药饮片炮制规范》。 2.炒淡豆豉：参考 2025 年版《中华人民共和国药典》中清炒法。						

(五十七) 补肾活血汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤科大成》 （清•赵濂）	熟地三钱，杜仲一钱，杞子一钱，破故纸三钱，菟丝子三钱，归尾一钱，没药一钱，莢肉一钱，红花五分，独活一钱，淡苁蓉一钱。水煎服。	熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	11.19g	水煎服。	【功效】 补肾活血止痛。 【主治】 肾虚血瘀之腰痛。症见腰部筋骨疼痛，痛有定处，或肿胀，或呼吸引痛，舌淡苔白，脉细涩。
		杜仲	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.的干燥树皮	生品	3.73g		
		枸杞子	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L.的干燥成熟果实	生品	3.73g		
		补骨脂	豆科植物补骨脂 <i>Psoralea corylifolia</i> L.的干燥成熟果实	生品	11.19g		
		菟丝子	旋花科植物菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.的干燥成熟种子	生品	11.19g		
		当归尾	伞形科当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥支根	生品	3.73g		
		没药	橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl.或哈地丁树 <i>Commiphora molmol</i> Engl.的干燥树脂	生品	3.73g		
		山茱萸	山茱萸科植物山茱萸 <i>Cornus officinalis</i> Sieb. et Zucc.的干燥成熟果肉	生品	3.73g		
		红花	菊科植物红花 <i>Carthamus tinctorius</i> L.的干燥花	生品	1.87g		
		独活	伞形科重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	3.73g		
		肉苁蓉	列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y. C. Ma 的干燥带鳞叶的肉质茎	生品	3.73g		
备注							

(五十八) 寿胎丸

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医学衷中参西录》 （清•张锡纯）	菟丝子四两（炒熟），桑寄生二两，川续断二两，真阿胶二两。上药将前三味轧细，水化阿胶和为丸，一分重（干足一分）。每服二十丸，开水送下，日再服。	菟丝子	旋花科植物菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam.的干燥成熟种子	炒菟丝子	149.2g	前三味粉碎为细末，再入阿胶制丸，每丸重约 0.37g。每服 20 丸，温水送服，日二服。	【功效】补肾安胎。 【主治】肾虚滑胎。症见妊娠期腰酸腹痛，胎动不安，或伴阴道流血、色黯淡，头晕耳鸣，两膝酸软，小便频数，或曾屡有堕胎，舌淡苔白，脉沉细而滑。
		桑寄生	桑寄生科植物槲寄生 <i>Viscum coloratum</i> （Komar.）Nakai 的干燥带叶的茎枝	生品	74.60g		
		续断	川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry 的干燥根	生品	74.60g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	生品	74.60g		
备注	炒菟丝子：建议参考 2020 年版《江苏省中药饮片炮制规范》。						

（五十九）活络效灵丹

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医学衷中参西录》 （清·张锡纯）	当归五钱，丹参五钱，生明乳香五钱，生明没药五钱。上药四味作汤服。若为散，一剂分作四次服，温酒送下。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	18.65g	水煎服。	【功效】活血化瘀，通络止痛。 【主治】气滞血瘀证。症见心腹四肢疼痛，疼痛部位固定，痛如针刺，跌打瘀肿，舌质紫暗或有瘀斑，脉弦或涩。亦治内外疮疡、癰疽积聚等。
		丹参	唇形科植物丹参 <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.的干燥根和根茎	生品	18.65g		
		乳香	橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw.树皮渗出的树脂	生品	18.65g		
		没药	橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl.或哈地丁树 <i>Commiphora molmol</i> Engl.的干燥树脂	生品	18.65g		
备注	鉴于原方直接服散剂量较大，建议采用汤剂进行制备。						

注：由于剂型和煎煮法不同，表中各药折算剂量与备注中的日服量可能存在差异（由小数点进位导致），建议以备注中各药的日服量折算结果进行研发。